

Pferde entwurmen

Wann	1-2 Monate nach Weideaustrieb (Juni/ Juli)	4-5 Monate nach Weideaustrieb (August/ September)	Bei Aufstallung (November/ Dezember)	Februar/ März
Gegen was	Kl. Strongyliden <i>P. equorum</i>	Kl. Strongyliden <i>P. equorum</i>	Kl. Strongyliden <i>P. equorum</i> , ggf. <i>Gastrophilus</i> -Larven, Bandwürmer	Kl. Strongyliden <i>P. equorum</i>
Wirkstoff	Makrozyklische Laktone	Benzimidazol, Pyrantel (Resistenzen!)	Makrozyklische Laktone, ggf. Praziquantel	Benzimidazol, Pyrantel (Resistenzen!)
Präparat	Equimax®	Strongid®-P Paste	Equimax®	Strongid®-P Paste
Bemerkung	Sicherheitsbehandlung	Kotprobe: Wenn positiv : Entwurmen und Kotprobe nach 4 Wochen Wenn negativ : nicht entwurmen	Sicherheitsbehandlung	Kotprobe: Wenn positiv : Entwurmen und Kotprobe nach 4 Wochen Wenn negativ : nicht entwurmen

Pferde bis zum 5. Lebensjahr regelmässig entwurmen (3-4 Wurmkur pro Jahr)

Verminderung des Parasitendrucks durch:

- Hygienische Stalleinstreu
- Tägliches entfernen des Kotes bei Matratzeinstreu
- Wöchentliches (besser alle 2-3 Tage) Entfernen des Kotes von Weiden und Ausläufen
- Keine Kompostierung oder Düngung mit Pferdemist auf Pferdeweiden
- Weiden alternierend mit Wiederkäuern bestossen